



Vilcacora - Koci Pazur (cięta) 250 g

Cena	28.90 zł
Dostępność	zostało tylko kilka sztuk
Numer katalogowy	5907377285366
Kod EAN	5907377285366
Producent	Natvita

Opis produktu

Vilcacora (Uncaria tomentosa), zwana również **Cat's claw (Koci pazur)** pochodzi z Ameryki Południowej, z Peru.

Vilcacora zwana jest korzeniem życia.

SKŁAD:

ajmalicina, akuammigina, kampesterol, katechiny, karboksylowe estry alkilowe, kwas chlorogenowy, cinchonain, corynantheina, corynoxaina, daucosterol, epikatechiny, harman, hirsuteina, hirsutina, izo-pteropodina, loganic kwasu lyaloside, mitraphylline, kwas oleanolowy, oleopalmitynowy kwasu, procyjanidyny, pteropodine, quinovic glikozydy kwasu rhynchophylline, rutyna, sitosteroli, speciophylline, stigmasterol, strictosidines, uncarine a do F oraz kwas wakcenowy.

DAWKOWANIE:

W przypadku sproszkowanej kory: 1 łyżeczka dziennie. (ok. 2 g)

Stosuje się ok. 1 łyżki stołowej kory na 0,5 l wody, gotować ok 15 minut. 1/2 - 1 szklanki wywaru raz dziennie i do 1 szklanki trzy razy dziennie w czasie potrzeby. Dodanie soku z cytryny lub octu do wywaru, podczas gotowania pomoże wydobyć więcej alkaloidów, a mniej garbników z kory. Użyj około 1 / 2 łyżeczki soku z cytryny lub octu na szklanę wody.

INTERAKCJE I DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Przeciwwskazane przed lub po przeszczepie jakiegokolwiek narządu, szpiku kostnego lub przeszczepu skóry.

Przeciwwskazane u osób, które chcą zajść w ciążę.

Substancje chemiczne w Vilcacora mogą **zmniejszyć agregację płytek krwi i krzepliwość krwi.**

Skonsultuj się z lekarzem, jeśli pacjent przyjmuje **coumadin lub inne leki rozrzedzające krew!**

Duże dawki (**3-4 gram na raz**) zostały zgłoszone, iż mogą powodować bóle brzucha i problemy żołądkowo-jelitowe, w tym biegunki (ze względu na zawartość garbników z kory) u niektórych osób.

Biegunka lub luźne stolce są zwykle łagodne i ustępują podczas dalszego użytkowania. Przerwać stosowanie lub zmniejszyć dawkę, jeśli biegunka utrzymuje się dłużej niż trzy lub cztery dni.

VILCACORY NIE PODAJEMY:

-w trakcie chemio- i radioterapii,

(można ją podawać trzy dni po zakończeniu chemio- i radioterapii, ale podawanie należy przerwać trzy dni przed kolejnym cyklem chemio- i radioterapii),

- pacjentkom w ciąży i matkom karmiącym,

- dzieciom do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach decyduje lekarz),

- pacjentom po przeszczepach lub przed planowanym przeszczepem,

- w przypadku przetaczania krwi oraz preparatów krwiopochodnych,

(można ją podawać trzy tygodnie po przetoczeniu, ale podawanie należy przerwać na tydzień przed planowanym przetoczeniem),

- pacjentom leczonym insuliną i niektórymi hormonami sterydowymi,

- pacjentom trzy dni przed i trzy dni po szczepieniach przeciwko chorobom zakaźnym.

Postać: pocięta kora

ilość w opakowaniu: **250 g**